Melibæus nodosus Fåhreus, *Act. Nov. Ups.* (1827), p. 50. — Mozambique : forêt d'Inhangondé (*G. Vasse*).

M. viridanus Cast. et Gory., *Monogr. Bupr.*, t. II (1839), *Coraebus*, p. 11, pl. III, fig. 15. — Harar (*du Bourg*).

Pseudagrilus sophoroides Murray, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 4e sér., t. II, p. 106. — Galla Itou (*du Bourg*).

Stenogaster diffusus Chevrol., *Silb. Rev. Ent.*, t. V (1837), p. 87. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Diguet*).

Collections recueillies par M. E.-R. Wagner dans la République Argentine. Coléoptères Buprestides,

par M. Ch. Kerremans.

Acherusia Childreni Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. I (1835), p. 2, pl. 1, fig. 2. — Chaco de Santa Fé : bords de la rivière las Garzas, à 20 kilomètres Ouest d'Ocampo.

Polycesta excavata Blanch., *Voy. Orbigny, Ent.* (1846), p. 149. — Kerrem., *Monogr.*, t. I (1905), pl. 10, fig. 5. — Chaco de Anatuya : Tentina; province de Santiago del Estero : environs d'Icaño, Mistol Paso.

Tyndaris planata Cast. Gory, *Monogr. Bupr.*, t. I (1835), p. 5, pl. 1, fig. 4. — Chaco de Santiago del Estero : la Palisa del Bracho, laguna Maïtana, environs d'Icaño.

Chrysesthes tripunctata Fab., *Mant. Ins.*, t. I (1787), p. 179. — Chaco de Santa Fé : las Garzas, bords du rio Las Garzas, environs d'Ocampo.

Psiloptera attenuata Fab., *Ent. Syst.* (1794), p. 187. — Brésil : Minas Geraes, environs de Passa Quatro, bords du rio de las Pedras, 1,000 mètres.

P. plagiata Gory, *Monogr. Supp.*, t. IV (1840), p. 84, pl. 14, fig. 80. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, la Palisa del Bracho, 25 kilomètres d'Icaño;

P. corynthia Fairm., *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1864), p. 264. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

P. tucumana Guér. et Perch., *Gen. Ins.* (1835), n° 2, pl. 6. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, la Palisa del Bracho, Barrancas.

Ectinogonia americana Herbst, *Col.*, t. IX (1801), p. 107, pl. 148, fig. 3. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, Barrancas.

E. denticollis Fairm., *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1864), p. 267. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

Chalcopoecila ornata Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1840), p. 93, pl. 16, fig. 90. — Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

Tylauchenia patagica Berg, *Ann. Soc. Argent.*, t. XIX (1885), p. 225. — Province de Santiago del Estero : rio Salado, environs d'Icaño.

T. linearis nov. sp. — Long., 14-16 millim.; larg., 5-6 millim.

T. crassicollis *vicina sed pronoto magis ampliato, antice et ad latera fulvo-marginato, elytris alternatim fulvo-lineatis.*

Cette espèce se rapproche, pour le facies, du *T. crassicollis,* mais le pronotum est plus développé et largement bordé de jaune fauve sur les côtés et le long de la marge antérieure, et tous les interstries alternes, c'est-à-dire 2, 4 et 6, ainsi que la marge latérale et l'interstrie sutural, sont jaune fauve et légèrement saillants. Le milieu du front avec une ligne fauve.

Assez grand, convexe, élargi en avant et atténué en arrière, le sommet légèrement pisciforme à cause de la saillie formée par les dents externes; pronotum noir à légers reflets bleus, élytres bleu foncé brillant à bandes longitudinales fauves. Dessous et pattes noirs et couverts d'une courte pubescence grise.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée. Pronotum grand, convexe, tronqué en avant, fortement bisinué en arrière, largement arqué sur les côtés; le milieu du disque avec une large et profonde dépression ovalaire interrompue avant le sommet; la surface couverte de points inégalement espacés et rides transversales autour du disque. Écusson médiocre, un peu enfoncé entre la suture. Élytres largement lobés à la base, sinueux sur les côtés, vers le tiers postérieur, et légèrement saillants en dehors au sommet, celui-ci tronqué et armé, de part et d'autre, de sept à huit dents inégales. Dessous finement et densément ponctué; pattes assez robustes.

Hab. : Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho, 25 kilomètres Nord-Ouest d'Icaño, et Mistol Paso.

T. crassicollis Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. I (1837), *Bupr.*, p. 113, pl. 29, fig. 156. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño; la Palisa del Bracho; 25 kilomètres d'Icaño; Barrancas.

T. guttulata Fairm. et Germ., *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1858), p. 738. — Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho,

20 et 25 kilomètres d'Icaño. Les deux exemplaires que j'ai sous les yeux sont un peu plus petits que le type, mais ils en présentent tous les caractères.

Melanophila albovillosa Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XLIII (1899), p. 331. — Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

M. antiqua Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XLIII (1899), p. 331. — — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho, environs d'Icaño.

Tetragonoschema purpurascens Kerrem., *Mém. Soc. Ent. Belg.* (1897), p. 15. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

T. undulata Steinh., *Atti. Soc. Ent. Ital.*, t. V (1872), p. 564. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho, environs d'Icaño, Guarda Escholta et Mistol Paso.

Agrilaxia agriliformis Thoms., *Typ. Bupr.*, app. 1 a (1879), p. 28. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho, environs d'Icaño.

A. decipiens Burm., *Stett. Ent. Zeit.*, t. XXXIII (1872), p. 385. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, Mistol Paso.

A. Wagneri nov. sp. — *Long. 4; lat. 1 millim. 3.*

Minuta, tota nigra, nitida, pronoto utrinque ad latera large cupreo-marginato, elytris vage costatis; antennis viridibus, abdomine cyaneo-nigro.

Petit, les côtes subparallèles, entièrement noir, les antennes vertes, l'abdomen d'un bleu obscur; les côtés du pronotum largement teintés de cuivreux pourpré, les élytres creusés d'un sillon le long du bord et présentant de part et d'autre, sur le disque, deux vagues côtes.

Tête convexe, entièrement et régulièrement couverte de points ocellés. Pronotum subrectangulaire, un peu plus large en avant qu'en arrière, la marge antérieure bisinuée avec les angles latéraux avancés et aigus et le lobe médian anguleux; les côtés droits, légèrement convergents vers la base; celle-ci tronquée; les angles postérieurs déprimés, le disque légèrement convexe, la surface couverte d'une ponctuation ocellée, semblable à celle de la tête, plus rugueuse sur les parties latérales cuivreuses que sur le disque. Écusson petit, triangulaire. Élytres de la largeur du pronotum à la base, sinués à hauteur des hanches, à peine élargis au tiers postérieur, atténués ensuite et séparément arrondis au sommet; le calus huméral linéaire et oblique; les bords latéraux creusés en gouttière, le disque avec

deux côtes très peu accentuées, la surface subrugueuse et chagrinée. Dessous finement pointillé, beaucoup moins rugueux que le dessus.

Hab. : Argentine, province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, Tuli Loma (*E.-R. Wagner*).

Curis bimaculata Cast. et Gory, *Monog. supp.*, t. IV (1840), p. 298, pl. 50, fig. 293; var. hemiptera Burm.

La Plata : bords du rio Salado, 25 kilomètres Nord-Ouest d'Icaño.

C. cinctipennis nov. sp. — *Long. 6 millim., lat. 2 millim.*

Ovata, apice attenuata, capite cuprea medio nigro-plagiata, pronoto cupreo, disco quadriplagiato, his plagis nigris; elytris nigris, late fulvocircumdatis. Subtus nitida, cuprea, abdominis segmentis tribus ultimis nigris, antennis tarsisque viridi-cæruleis.

Ovalaire, aplani en dessus; tête cuivreuse avec une tache obscure au milieu du front; pronotum cuivreux avec, sur le disque, quatre taches noires disposées en carré; élytres noirs sur le disque, largement et entièrement bordés de jaune fauve; dessous très brillant, d'un cuivreux éclatant, avec les trois derniers segments abdominaux noirs; antennes et tarses d'un vert bleuâtre.

Tête aplanie, le front très légèrement déprimé, entièrement couverte de points ocellés très réguliers, plus fins et plus rapprochés sur les côtés, le long des yeux, que sur le milieu. Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de la même ponctuation ocellée que celle de la tête, transversalement déprimé de chaque côté au-dessus de la base; celle-ci tronquée; les côtés légèrement arqués et convergents vers l'avant. Écusson très petit, triangulaire. Élytres transversalement sillonnés le long de la base, régulièrement atténués en arc depuis la base jusqu'au sommet, celui-ci largement et séparément arrondi et laissant le pygidium à découvert; la surface rugueuse, la rugosité consistant en fines écailles anguleuses. Dessous plus lisse et plus brillant que le dessus, couvert d'une ponctuation superficielle et aciculée, plus accentuée sur le dernier segment abdominal.

Hab. : Argentine, province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, Mistol Paso.

C. bella Guér., *Voy. Duperr., Ent.*, t. II (1830), p. 66, pl. 2, fig. 11. — Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho, 25 kilomètres Nord-Ouest d'Icaño.

Chrysobothris Desmaresti Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1831), *Buprestis*, p. 34, pl. 8, fig. 39. — Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

Ch. consanguinea Cast. et Gory, *Monogr.*, t. II (1838), *Colobogaster*, p. 10, pl. 2, fig. 8. — Chaco de Anatuya : Tentina.

Ch. decolorata Cast. et Gory, *Monogr.*, t. II (1838), *Colobogaster*, p. 11, pl. 2, fig. 10. — Province de Santiago del Estero : environs d'Icaño, Mistol Paso.

Ch. rubimaculata Cast. et Gory, *Monogr.*, t. II (1838), *Colobogaster*, p. 10, pl. 2, fig. 9. — Chaco de Santa Fé : bords du rio Las Garzas, 25 kilomètres à l'Ouest d'Ocampo.

Ch. Wagneri nov. sp. — *Long. 16-21 millim.; lat. 6-8 millim.*

Robusta, supra æenea, fronte postice bicarinata, pronoto medio impresso, ad latera strigoso, elytris valde rugosis, utrinque lobo medio biimpresso; subtus æenea, abdominis segmentis ultimis cyaneo-variegatis, tarsis cyaneis.

Robuste, peu convexe, atténué en avant et acuminé en arrière, bronzé obscur en dessus et très rugueux, le dessous d'un bronzé plus clair, avec les trois derniers segments abdominaux plus ou moins variés de bleu d'acier ; les tarses bleu d'acier.

Tête rugueuse, plane; front rugueux et impressionné en avant, avec deux carènes superposées et arquées en arrière; épistome échancré entre deux lobes arqués et contournant les cavités antennaires. Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure tronquée, les côtés anguleux, subparallèles et légèrement convergents en arrière vers la base, obliques et plus convergents vers le sommet; la base fortement bisinuée avec le lobe médian peu avancé et tronqué; le milieu du disque impressionné; la surface très rugueuse, couverte sur les côtés de rides épaisses, sinueuses, anastomosées et transversales. Écusson très petit, triangulaire. Élytres lobés à la base où se remarquent, entre le calus humeral et la suture, deux fossettes dont une interne, profonde et arrondie, et une autre externe, plus vague; les côtés parallèles jusque vers le milieu, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet, la marge latérale crénelée sur toute son étendue, les dents devenant plus fortes et plus espacées depuis le tiers postérieur jusqu'à l'extrémité; une côte présuturale bien marquée, interrompue vers la base; les traces de deux côtes discales, celles-ci se confondant avec des vermiculations irrégulières, sans allure déterminée, et quelques traces des impressions usuelles du groupe de *Ch. femorata* J., les parties non saillantes finement pointillées et couvertes, à l'état frais, d'une pulvérulence blanche. Dessous d'un bronzé plus clair et un peu cuivreux en avant, verdâtre vers le milieu, bleu d'acier en arrière, beaucoup moins rugueux, quoique vermiculé, que le dessus; les bords des segments abdominaux lisses; extrémité du dernier segment tridentée, les dents latérales plus longues et plus aiguës que la médiane, qui

est à peine saillante ; le milieu de l'abdomen largement canaliculé, sauf sur le dernier segment.

Hab. : Argentine, province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, Averias, la Palisa del Bracho, Toli Loma, environs d'Icaño.

Ch. holochalcea Burm., *Stett. Ent. Zeit.*, t. XXXIII (1872), p. 380. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, Averias, la Palisa del Bracho, Toli Loma, environs d'Icaño.

Ch. rugosa Cast et Gory, *Monogr.*, t. II (1838), p. 54, pl. 10, fig. 74. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, Averias, la Palisa del Bracho, Toli Loma, environs d'Icaño.

Ch. furcata nov. sp. — *Long. 8 millim.; lat. 3 millim.*

Tota æneo-nigra, nitida, prothorace antice latiore, elytrorum costis validis, subtus antice ænea, abdominis segmento ultimo furcato.

D'un noir luisant un peu bronzé en dessus, le dessous bronzé en avant et noir en arrière.

Front surmonté de deux carènes, l'une sinueuse, la postérieure, séparant le vertex du front, arqué; la partie comprise entre l'épistome et la première carène couverte de fines rides écailleuses et concentriques, celle comprise entre les deux carènes couverte de points égaux et très rapprochés; le vertex caréné longitudinalement. Pronotum transversal, élargi en avant et rétréci en arrière, la marge antérieure tronquée avec les angles antérieurs tronqués, les côtés parallèles au milieu et ensuite anguleusement convergents vers la base ; celle-ci fortement bisinuée avec le lobe médian arrondi; les côtés irrégulièrement et peu profondément impressionnés; la surface couverte de rides parallèles et onduleuses. Écusson petit, triangulaire. Élytres largement arrondis à l'épaule, subparallèles et très légèrement divergents jusqu'au tiers postérieur, ensuite obliquement atténués et dentelés sur les côtés jusqu'au sommet; la surface couverte d'une ponctuation dense, assez épaisse et très égale entre les côtes usuelles, dont les deux discales sont lisses et saillantes. Dessous plus finement ponctué que le dessus; les bords du dernier segment abdominal lisses, son sommet bifurqué.

Hab. : Argentine, province de Santiago del Estero : Troncal, 40 kilomètres Ouest de Salavina.

Actenodes fulminata Schœnh., *Syn. Ins.* (1817), *app.*, p. 121. — Chaco de Santiago del Estero : la Palisa, bords du rio Salado, 20 kilomètres Nord-Ouest d'Icaño.

Dactylozodes quadrifasciata Mann., *Bull. Mosc.* (1837), p. 102. — Gran Chaco : Loma Negra, Nord de Florencia et du rio Tapenaga; chaco de Santa Fé : Las Garzas, 25 kilomètres d'Ocampo.

D. Brullei Cast et Gory, *Monogr.*, t. II (1839), *Zemina*, p. 4, pl. 2, fig. 5. — Chaco de Santa Fé : bords du rio Las Garzas, 25 kilomètres à l'Ouest d'Ocampo.

D. humeralis Gory, *Monogr. Supp.*, t. IV (1841), p. 199, pl. 33, fig. 191. — Gran Chaco : bords du rio Tapenaga, colonie Florencia.

D. pubibunda Cast. et Gory, *Monogr.*, t. II (1839), *Zemina*, p. 4, pl. 2, fig. 9. — Gran Chaco : bords du rio Tapenaga, colonie Florencia; chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

Hyperantha stigmaticollis Desm., *Ann. Fr.* (1843), p. 19, pl. 1, fig. 2. — Chaco de Santiago del Estero : la Palisa, bords du rio Salado, 25 kilomètres Nord-Ouest d'Icaño.

H. Stempelmanni C. Berg., *Ann. Univ. Buen. Air.*, t. VI (1889), p. 154. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, Averias.

Diadora argentina C. Bruch, *Deut. Ent. Zeit.*, 1911. — Chaco de Santiago del Estero : bords du rio Salado, la Palisa del Bracho, 25 kilomètres N.-O. d'Icaño, Mistol Paso.

Agriloides tuberculatus Klug, *Entom. Braz.* (1827), p. 9, pl. 10, fig. 10. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

Agrilus furcatipennis Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837), p. 9, pl. 2, fig. 8. — Haut Parana : Tiju Cuare, près San Ignacio, Missions, Le Trou de l'Iguane.

A. verutus Kerrem., *Mém. Soc. Ent. Belg.* (1897), p. 94. — Argentine : Misiones, environs de San Ignacio, villa Lutecia.

A. chrysostictus Klug., *Ent. Bros.* (1827), p. 7, pl. 40, fig. 6. — Argentine : Misiones, environs de San Ignacio, villa Lutecia.

A. subinflatus Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XLIII (1899), p. 345. — Gran Chaco : bords du rio Tapenaga, colonie Florencia.

A. aurocephalus Gory, *Monogr. Supp.*, t. IV (1841), p. 218, pl. 36, fig. 209. — Argentine : Misiones, environs de San Ignacio, villa Lutecia.

A. ignavus Kerrem., *Mém. Soc. Ent. Belg.* (1897), p. 104. — Chaco de Santa Fé : las Garzas, 25 kilomètres Ouest d'Ocampo.

A. arnus Gory, *Monogr. Supp.*, t. IV (1841), p. 232, pl. 38, fig. 223. — La Plata : bords du rio Salado, 25 kilomètres Nord-Ouest d'Icaño.

A. flaveolus Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837) p. 25, pl. 5, fig. 30. — Chaco de Santa Fé : bords du rio Las Garzas, 25 kilomètres Ouest d'Ocampo.

A. Aristæus nov. sp. — *Long. 7 millim.; lat. 2 millim.*

A. LEUCOSTICTO *vicinus sed minor, totus claro-æneo-purpureus, maculis albido-ochraceis numerosis ornatus.*

Voisin de l'*A. leucostictus* Kl. pour le facies et le dessin, mais plus petit, d'un bronzé pourpré, clair et brillant, orné de taches et de bandes nombreuses, d'un blanc jaunâtre.

Oblong ovale, assez robuste, plan en dessus, atténué en arrière. Tête largement creusée en avant, l'impression couverte d'une pulvérulence blanc jaunâtre; la surface rugueuse et paraissant ridée. Pronotum un peu plus long que large, à peine plus étroit en avant qu'en arrière; étroitement rebordé en avant, la marge antérieure formant un lobe très avancé et subanguleux au milieu; le disque avec deux profondes fossettes médianes et superposées, remplies de la même pulvérulence blanc jaunâtre qui se remarque le long des côtés, les parties glabres de la surface couvertes de rides sinueuses. Écusson court, caréné transversalement, noirâtre. Élytres laissant à découvert, sur les côtés, une notable portion de la région dorso-latérale des segments abdominaux, largement creusés le long de la suture, ce sillon orné d'une ligne pubescente et pulvérulente de blanc jaunâtre, interrompue au tiers postérieur, puis d'une tache et enfin d'une courte ligne apicale formées de la même pulvérulence. Dessous, côtés et parties visibles de la région dorso-abdominale, couverts de taches pulvérulentes sur chaque section fragmentaire du corps. Pattes courtes et assez robustes.

Hab. : Santiago del Estero : environs d'Icaño, Mistol Paso.

A. GRANULICOLLIS Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837), p. 29, pl. 6, fig. 36. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, Averias.

A. Wagneri nov. sp. — *Long. 8 millim.; lat. 2 millim.*

A. RUFICOLLI *affinis sed multo major et robustior, capite cæruleo-viridi, thorace amplo, claro-æneo, transversim rugato, elytris planatis, surde nigro-æneis, dorso planato; subtus claro-æneo-nitidus.*

Du groupe des *A. ruficollis* Fab., *thoracicus* et *thoracellus* Cast. et Gory, mais plus grand et plus robuste, le pronotum plus développé, avec ses impressions moins nettes et moins profondes, autrement disposées sur les côtés, la structure élytrale différente.

Tête forte, bleu verdâtre, entièrement sillonnée, le sillon plus large en avant qu'en arrière, la surface rugueuse et couverte de fines rides sinueuses. Pronotum bronzé clair, un peu plus large que long et plus large en avant qu'en arrière; bisinué et largement lobé en avant, à peine impressionné sur le disque, déprimé sur les côtés, en avant et en arrière, la surface couverte de rides sinueuses et parallèles, très fines et très nettes; carène postérieure rugueuse, peu marquée. Écusson court, caréné transver-

salement. Élytres laissant à découvert sur les côtés une étroite portion dorso-latérale du corps, impressionnés à la base, séparément arrondis au sommet; la surface couverte de fines écailles aciculées, très régulières et très également rapprochées. Dessous brillant, finement pointillé rugueux; mentonnière du prosternum courte. Pattes peu robustes.

Hab. : Chaco de Santa Fé : bords du rio de Las Garzas, 25 kilomètres Ouest d'Ocampo.

A. THORACICUS Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837), p. 58, pl. 13, fig. 16. — Argentine : Misiones, environs de San Ignacio, villa Lutecia.

A. THORACELLUS Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837), p. 59, pl. 13, fig. 77. — Argentine : Misiones, environs de San Ignacio, villa Lutecia.

A. mandatus nov. sp. — *Long. 6 millim.; lat. 1,3 millim.*

Elongatus, antice attenuatus, postice acuminatus, totus surdo-æneus et griseo-pilosus.

Étroit, allongé, atténué en avant et acuminé en arrière, d'un bronzé terne, obscur et entièrement couvert d'une courte pubescence grise.

Tête étroite, convexe, entièrement sillonnée, assez fortement granuleuse. Pronotum plus long que large, sa plus grande largeur au milieu, aussi large en avant qu'en arrière, bisinué en avant avec un large lobe médian arqué, le disque faiblement et longitudinalement sillonné; carène postérieure faible, allongée et très rapprochée du bord; la surface rugueuse et couverte de rides sinueuses. Écusson cuivreux, caréné transversalement. Élytres allongés, faiblement déprimés à la base et le long de la suture, séparément subacuminés et dentelés au sommet, la surface couverte de rugosités simulant des écailles. Dessous moins rugueux que le dessus; mentonnière du prosternum avancée, grande et entière. Pattes peu robustes.

Hab. : Missiones, environs de San Ignacio, villa Lutecia.

A. NIGER Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837), p. 58, pl. 13, fig. 75. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, Averias.

PARAGRILUS ABJUNCTUS Kerrem., *Wytsm. Gen. Ins.*, fasc. 12 (1903), *Bupr.*, p. 296. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, paso de San Jose, 15 kilomètres Nord d'Icaño, Averias, la Palisa del Bracho.

P. BERGI Kerrem., *Wytsm. Gen. Ins.*, fasc. 12 (1903), *Bupr.*, p. 296. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, paso de San Jose, 15 kilomètres Nord d'Icaño, Averias, la Palisa del Bracho.

Taphrocerus Wagneri nov. sp. — *Long. 4 millim.; lat. 1,5 millim.*

Totus niger, nitidus, leviter æneo-micans, capite amplo et lato, antice depresso et sulcato, thorace transverso, antice transversim secus marginem externam sulcato, lateribus utrinque oblique sulcatis, elytris profunde punctato-striatis, punctis antice validioribus; subtus lævior, subtilissime punctatus.

Facies se rapprochant de celui du *T. mexicanus* Waterh., mais la tête plus forte, les élytres plus grossièrement ponctués et dépourvus de taches pubescentes blanches.

Tête large et forte, les yeux éloignés des bords du pronotum et légèrement saillants en dehors; la surface presque lisse, couverte de fins points espacés, le front creusé et sillonné en avant. Pronotum beaucoup plus large que long, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, tronqué en avant, la marge antérieure entièrement et étroitement sillonnée le long du bord; les côtés obliquement impressionnés, l'impression arquée et longeant les côtés et la base; celle-ci bisinuée; la surface presque lisse, couverte de points superficiels et très espacés. Écusson petit, triangulaire. Élytres couverts de séries longitudinales de points très épais à la base et diminuant graduellement en épaisseur et en régularité à mesure qu'ils se rapprochent du sommet. Dessous lisse et brillant, à peine ponctué.

Hab. : Argentine, Haut Parana : environs de Misiones, Trou de l'Iguane.

Seconde expédition antarctique française (1908-1910).

ALCYONAIRES (2^e Note préliminaire),

par M. Ch. Gravier.

---

4. Famille des **PRIMNOIDÆ** (Milne-Edwards).

Thouarella variabilis Wright et Studer.

1889. *Thouarella variabilis* Wright et Studer. Report on the Alcyonaria, *Reports on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger,* Zoology, vol. XXXI, p. 68, pl. 21, fig. 1.

1905. *Thouarella variabilis* Menneking, Ueber die Anordnung der Schuppen und das Kanalsystem bei *Stachyodes ambigua* (Studer), *Caligorgia flabellum* (Ehrenberg), *Amphilaphis abietina* (Studer) und *Thouarella variabilis* (Wright und Studer), *Archiv für Naturgesch.*, Jahrg. LXXI, Bd 1, Heft 3, p. 260, Taf. 9, fig. 9, 10, 11, 21 et 22.